



## **TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E ORIENTAÇÕES PRÉ E PÓS-EXAME CÁPSULA ENDOSCÓPICA**

### **1. O que é exame de cápsula endoscópica?**

O exame de cápsula endoscópica é realizado para avaliar o intestino delgado por meio da ingestão de uma cápsula descartável que transmite imagens por ondas de rádio. Assim, o exame de cápsula endoscópica possibilita o diagnóstico de doenças deste órgão.

### **2. Como é feita?**

A ingestão da cápsula é feita sem dificuldades e não é necessária sedação. Um receptor para o recebimento das imagens ficará preso a você por meio de um cinto e a cápsula será eliminada junto com a evacuação. Você será instruído a retornar à Clínica Coy ao redor de 8 horas após o início do exame para retirada do receptor de imagens.

### **3. Quais os principais riscos?**

O exame de cápsula endoscópica é um procedimento com baixa taxa de complicação, sendo a mais comum, a retenção da capsula no interior do intestino.

Se houver qualquer suspeita de complicação ou dúvidas, ligue para a Clínica Coy ou para o médico que realizou seu exame. Caso procure o Pronto Atendimento, sempre entre em contato também com a Clínica Coy ou com o médico que realizou o seu exame. O telefone do médico será entregue com as orientações pós-exame e juntamente com o laudo.

### **4- Instruções para o preparo**

**Dia anterior ao exame** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Desjejum normal até às 8:00 da manhã. Depois dieta líquida.

#### **Dieta líquida**

Água, chá, suco de fruta coado, água de coco, bebidas tipo gatorade, gelatinas (evite as de coloração vermelha), picolés de frutas, suspiro. Caldo de carne e/ou legumes (coe e tome apenas o caldo– não bater no liquidificador). Não tome leite ou derivados.

Você poderá fazer uso de dois frascos de Fresubin Juicy (um a dois frascos), ao longo do dia para diminuir a sensação de fraqueza. É encontrado em casas de suplementos dietéticos.

**Observação importante:** Não tome buscopan, tropinal ou hioscina. Não tome laxantes

**Dia do exame** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Tome 60 gotas de dimeticona (Luftal, Flagass, Mylicon, etc) ao acordar. Mantenha jejum de 12 horas anteriores ao horário marcado. Após duas horas do início do exame é permitido tomar líquidos incolores. Após quatro horas, é permitida refeição leve.

**Observações importantes: Não tome buscopan, tropinal ou hioscina. Não tome laxantes.**

Não durma ou faça exercícios vigorosos durante a realização do exame.

5. Como retirar o resultado?

O resultado do exame será entregue posteriormente na Clínica Coy em até sete dias úteis. Nossas recepcionistas informarão a data de entrega.

6. Sobre a Clínica Coy

A Clínica Coy dispõe de profissionais treinados e com experiência para que seu exame seja confortável, com emprego de equipamentos modernos que possibilitam imagens de alta qualidade. Treinamentos de toda equipe para a identificação e tratamento de intercorrências ocorrem anualmente. As recepcionistas da Clínica Coy são orientadas para encaminhar aos médicos quaisquer demandas ou dúvidas sobre os procedimentos antes ou após sua realização.

7. Consentimento pós-informado: Paciente/ Responsável

Fui devidamente esclarecido(a) e informado(a) quanto aos riscos previsíveis, intercorrências inesperadas e cuidados pós-procedimento, tendo compreendido perfeitamente todas as questões e autorizo a realização do procedimento proposto no paciente: \_\_\_\_\_.

Nome:

RG:

Assinatura

data

8. Informativo Médico:

Expliquei de forma clara e objetiva todo o procedimento: exame e/ou tratamento e/ou cirurgia a que o(a) paciente acima referido(a) está sujeito(a), e coloquei-me a disposição para qualquer esclarecimento adicional. Declaro que orientei o paciente seu acompanhante após o exame endoscópico. De acordo com o meu entendimento, o(a) paciente e/ou seu responsável tem condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome:

CRM:

Assinatura

data