

ORIENTAÇÕES PARA COLONOSCOPIA - MANHÃ

exames marcados para o período da **manhã** dia ____ / ____ / ____ horário ____

Os exames são realizados sob sedação e acompanhamento de anestesista. A Clínica Coy realiza visita pré- anestésica. Entre em contato para maiores informações.

Venha com acompanhante, pois devido à sedação, você não poderá dirigir ou retornar para casa sozinho.

Exames não serão realizados sem a presença de acompanhante.

Caso faça uso de algum tipo de anticoagulante (Marevan, Clopidogrel, Plavix, etc), favor avisar a **CLÍNICA COY** imediatamente. Estes medicamentos necessitam que seu uso seja suspenso alguns dias antes do exame, devido ao risco de sangramento.

Traga o pedido médico, exames anteriores e guia autorizada se tiver convênio médico.

Você será solicitado que assine o termo de consentimento. Leia o termo de consentimento, disponibilizado neste site e na **CLÍNICA COY**. Caso você tenha qualquer dúvida, os médicos da Clínica Coy estão a disposição para esclarecimentos.

Para que seu exame seja mais rápido e confortável, o preparo intestinal é fundamental. Para isso, é preciso que as instruções sejam corretamente seguidas. Em caso de dúvida, entre em contato com a **CLÍNICA COY** pelo telefone 3234-9785 das 8:00 as 17:00 horas.



PREPARO INTESTINAL

Dia anterior ao exame ____/____/____

Desjejum normal até às 8:00 da manhã. Depois dieta líquida.

Dieta líquida

Água, chá, suco de fruta coado, água de coco, bebidas tipo gatorade, gelatinas (evite as de coloração vermelha), picolés de frutas, suspiro. Caldo de carne e/ou legumes (coe e tome apenas o caldo— não bater no liquidificador). Não tome leite ou derivados.

Você poderá fazer uso de dois frascos de Fresubin Juicy (um a dois frascos), ao longo do dia para diminuir a sensação de fraqueza. É encontrado em casas de suplementos dietéticos.

Tome dois comprimidos de Dicolax às 16:00 horas na véspera do exame.

Das 19:00 às 21:00 horas

Tome um copo a cada 15 minutos de MANITOL 10% (150 gramas diluídos em 1 litro e meio de água ou suco). Para prevenir náuseas, é aconselhável tomar um comprimido de Plasil antes do Manitol. Após o Manitol, se apresentar náusea, tome picolé de limão.

Dia do exame ____/____/____

Você poderá tomar água ou líquidos claros (por exemplo, chá) até 3 horas antes do exame.

Compareça à **CLÍNICA COY** 15 minutos antes do horário do exame.

CLÍNICA COY, exames de qualidade desde 1990